

EXILIS®

INGREDIENTE ACTIVO	6-benciladenina.
NOMBRE QUIMICO	Benciladenina
GRUPO QUIMICO	Giberelinas y Citoquininas
CONCENTRACION Y FORMULACION	6-BA 21,2 g/L, SL (Concentrado soluble)
MODO DE ACCION	Sistémico. Fitorregulador para raleo y aumento de tamaño de frutos.
FABRICANTE/FORMULADOR	FINE AGROCHEMICALS LTD., Inglaterra.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	AGROCONNEXION LTDA.
TOXICIDAD	IV: Producto que normalmente no ofrece peligro. LD 50 (producto comercial): Oral: >5 g/Kg en ratas
ANTIDOTO	No existe antídoto específico
AUTORIZACIÓN S.A.G. N°	4234

INSTRUCCIONES DE USO

EXILIS® es un agente raleador post floración, aumenta el tamaño de los frutos como consecuencia de lo anterior. Un raleo óptimo se obtiene con temperaturas de 20 - 25°C por 3 a 4 días y con alta humedad relativa. La intensidad de la respuesta a la aplicación depende del estado de los frutos, condición fisiológica del árbol, variedad de manzana y condiciones climáticas, como nubosidad, humedad relativa y temperaturas extremas (<7°C ó >32°C), anteriores o posteriores a la aplicación. En árboles estresados, por enfermedad o estrés fisiológico, se recomienda usar las dosis bajas. Retrasar la aplicación en caso de lluvia, hasta que las flores y frutitos estén sin la presencia de gotas. Lluvias 6 horas después de la aplicación pueden reducir los efectos esperados. **EXILIS®** es un raleador para ser usado como tratamiento complementario a otros métodos de regulación de carga frutal. Dirigir el 80% de la pulverización a las 2/3 partes superiores del árbol. Los resultados de **EXILIS®** mejoran si es aplicado por la mañana o al atardecer para asegurar un secado lento y maximizar la absorción. Puede ser aplicado con máquina pulverizadora convencional. Asegurar un mojamiento completo del follaje y las flores. El volumen de agua para la aplicación deberá ser ajustado según densidad de plantación y tamaño de los árboles.

Cultivo	Concentración	Objetivo	Época	N° de aplicaciones
Manzanos	100-200 ppm (500-1000 mL en 100 L de agua)	Raleo	Fruto rey de 5-15 mm de diámetro	1 o 2 aplicaciones cada 7-10 días
	10 – 50 ppm (50-250 mL en 100 L agua)	Aumento de tamaño de frutos	Desde caída de pétalos	2 a 4 aplicaciones cada 3-10 días

INSTRUCCIONES PARA HACER LA MEZCLA

Para mejorar la actividad de **EXILIS®** se recomienda bajar el pH de la mezcla de aplicación a 5,0-6,5. Para ello se recomienda el uso de **INDICATE-5®**. No aplicar con pH 8 o superior.

CARENCIA

No tiene. **EXILIS®** es un raleador para ser aplicado dentro de los primeros 30 días después de la floración.

PRECAUCIONES

Almacenar en lugar fresco, lejos de alimentos semillas u otros productos. Mantener lejos del alcance de niños o personas no responsables y de mascotas. Puede causar irritación de ojos y piel.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros agroquímicos. **EXILIS®** es compatible con tensoactivos y con la mayoría de los raleadores de post-floración.

FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad a los cultivos cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y buenas prácticas agrícolas.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Se puede reingresar al área tratada cuando se haya secado la aplicación sobre el follaje, aproximadamente 12 horas después. No tiene restricciones para el reingreso de animales

® Marca registrada de FINE AGROCHEMICALS. LTD.

